АНАЭРОЦЕФ® (МНН Цефокситин)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Анаэроцеф®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (абсцессы легких, эмпиема плевры, аспирационная пневмония)	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов ***Дети*:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	Зависит от нозологии и клинического течения; парентеральный курс, в среднем 10-14 дней
Интраабдоминальные инфекции (без перитонита)	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов ***Дети*:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	3-5 дней
Вторичный перитонит	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов ***Дети*:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	7-10 дней
Внутрипеченочный абсцесс	**АНАЭРОЦЕФ** - 2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов; при подозрении на этиологическую роль Entamoeba histolitica + метронидазол – 500 мг в/в каждые 8 часов	10-14 дней
Неосложненная гонорея	**АНАЭРОЦЕФ** - 2 г в/м + пробенецид 1 г per os однократно	
Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин	**АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 ч + доксициклин – 100 мг в/в или per os каждые 12 часов (после клинического улучшения парентеральное введение продолжают 48 часов)	Полный курс АБ терапии -14 дней(ступенчатая терапия предпочтительна)
Амнионит, септический аборт, эндометрит	**АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 ч + доксициклин – 100 мг в/в или per os каждые 12	Зависит от тяжести; в среднем 7-14 дней
Тромбофлебит вен таза (как инфекционное осложнение абортов, операций на органах малого таза, эндометрита)	**АНАЭРОЦЕФ** – 2 г в/в каждые 6 ч	10-14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей (раневая инфекция, пролежневые язвы)	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов ***Дети*:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	Зависит от тяжести и этиологии; в среднем от 7 до 14 дней
Одонтогенные инфекции (абсцессы и флегмоны клеточных пространств головы и шеи)	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов ***Дети*:*** **АНАЭРОЦЕФ** - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	10-14 дней
Инфекция у больных с синдромом диабетической	**АНАЭРОЦЕФ** - 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов	14 дней

стопы		
Периоперационная антибиотикопрофилактика в колопроктологии, гинекологии, акушерстве, травматологии.	***Взрослые:*** **АНАЭРОЦЕФ** – 2 г в/в за 30 мин. до разреза Кесарево сечение: **АНАЭРОЦЕФ** – 2 г в/в после пережатия пуповины ***Дети:*** **АНАЭРОЦЕФ** – 30-40 мг/кг в/в за 15-30 мин. до разреза	При необходимости, в течение первых 24 часов после операции 1-2 г в/в или в/м каждые 8 часов (у детей 30-40 мг/кг каждые 8-12 часов)