

АЗТРЕАБОЛ® (МНН Азтреонам)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарат Азтреабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит, вызванный грамотрицательными бактериями	<i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 2г в/в каждые 6 часов <i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 6 часов <i>Дети старше 2 лет:</i> АЗТРЕАБОЛ - 50 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 10-14 дней
Бактериальный менингит у больных с аллергией на цефалоспорины и пенициллины	<i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 2г в/в каждые 6 часов+ ванкомицин -15 мг/кг в/в каждые 6 часов. <i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 6 часов+ ванкомицин -15 мг/кг в/в каждые 6 часов. <i>Дети старше 2 лет:</i> АЗТРЕАБОЛ - 50 мг/кг в/в каждые 6 часов+ ванкомицин -15 мг/кг в/в каждые 6 часов.	Зависит от возбудителя; в среднем 10-14 дней
Внебольничная и госпитальная пневмония, вызванные грамотрицательными бактериями	<i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 1-2 г в/в каждые 8 часов <i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 8 часов	14-21 день
Инфекции желчевыводящих путей (холангит, холецистит)	<i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 1-2г в/в или в/м каждые 8 часов+/- метронидазол 500 мг каждые 8 часов в/в или per os <i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 8 часов+/- метронидазол 7,5 мг/кг в/в или per os каждые 8 часов	7-10 дней
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)	<i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 1-2г в/в или в/м каждые 8 часов+/- метронидазол 500 мг каждые 8 часов в/в или клиндамицин 900мг в/в каждые 8 ч. (или 600 мг в/м каждые 6ч.) <i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 8 часов+/- метронидазол 7,5 мг/кг каждые 6- 8 часов в/в или клиндамицин 30-40	7-10 дней

	мг/кг/сутки в/в или в/м в 3-4 введения	
Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)	<p>Взрослые: <i>острый неосложненный цистит</i> АЗТРЕАБОЛ – 1г в/в однократно, <i>среднетяжелые</i> АЗТРЕАБОЛ - 0,5-1 г в/в или в/м каждые 12 часов <i>Тяжелые и осложненные ИМВП</i> АЗТРЕАБОЛ - 1,0 г в/в или в/м каждые 8 часов Дети: АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в или в/м каждые 8 часов</p>	Неосложненные – 7 дней; Тяжелые и осложненные- 10-14 дней
Инфекции органов малого таза у женщин (в т. ч. послеродовой эндометрит, септический аборт)	<p>Взрослые: АЗТРЕАБОЛ – 1 - 2г в/в или в/м каждые 8 часов+ метронидазол 500 мг в/в или per os каждые 8 часов или клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 часов (или 600 мг в/м каждые 6 часов)+/- доксициклин 100 мг в/в или per os каждые 12 часов</p>	10-14 дней
Сепсис, вызванный грам (-) бактериями	<p>Взрослые: АЗТРЕАБОЛ – 2г в/в каждые 6-8 часов+/- цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений Дети до 2 лет: АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 6-8 часов+/- цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений Дети старше 2 лет: АЗТРЕАБОЛ - 50 мг/кг в/в каждые 6-8 часов +/- цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений</p>	14-21 день
Легочная инфекция у больных муковисцидозом	<p>Взрослые: АЗТРЕАБОЛ – 2 г в/в каждые 6 часов+/- цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений (тобрамицин, амикацин)</p>	21 день

	<p><i>Дети до 2 лет:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 6 часов+/- антисинегнойные цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений (тобрамицин, амикацин)</p> <p><i>Дети старше 2 лет:</i> АЗТРЕАБОЛ - 50 мг/кг в/в каждые 6 часов+/- антисинегнойные цефалоспорины III-IV поколений или аминогликозиды II- III поколений (тобрамицин, амикацин)</p>	
Неосложненная гонорея	АЗТРЕАБОЛ – 1г в/м однократно	
Осложненная кишечная инфекция, вызванная Salmonella spp.	<p><i>Взрослые:</i> АЗТРЕАБОЛ – 1-2г в/в или в/м каждые 8 часов</p> <p><i>Дети:</i> АЗТРЕАБОЛ - 30 мг/ кг в/в каждые 6-8 часов</p>	