

## ЦЕФАБОЛ® (МНН Цефотаксим)

### Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Цефабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (дети старше 1 мес. и взрослые)	<b>Взрослые:</b> ЦЕФАБОЛ - 2 г в/в каждые 6-8 часов + хлорамфеникол 75-100 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6 часов <b>Дети:</b> ЦЕФАБОЛ – 100-200 мг/кг/сут в/в или в/м каждые 6-8 часов+ хлорамфеникол 75-100 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 10-14 дней
Бактериальный менингит (дети до 1 мес.)	<b>Новорожденные (0-4 недели):</b> ЦЕФАБОЛ – 200 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6-8 часов + ампициллин 200-300 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6 часов <b>Новорожденные (4-12 недель):</b> ЦЕФАБОЛ – 200 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6-8 часов + ампициллин 200-300 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 6 часов.	Зависит от возбудителя, в среднем 10-14 дней
Синуситы, острый и обострение хронического	<b>Взрослые:</b> ЦЕФАБОЛ - 1 г в/в или в/м каждые 6-8 часов <b>Дети:</b> ЦЕФАБОЛ - 20-40 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов	10-14 дней, рекомендуется ступенчатая терапия
Внебольничная пневмония у взрослых, лечение в условиях стационара	<b>ЦЕФАБОЛ:</b> 1 - 2 г в/в каждые 6/8 часов +/- азитромицин 500 мг внутрь 1р/сутки (продолжительность 3 дня)	7-10 дней
Внебольничная пневмония у детей, тяжелое течение, лечение в условиях стационара	<b>ЦЕФАБОЛ:</b> 50 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов +/- азитромицин 10 мг/кг/сутки (макс.доза 500 мг/сутки)	7-10 дней
Вторичный перитонит	<b>Взрослые:</b> ЦЕФАБОЛ – 1-2 г в/в или в/м каждые 6-8 часов	7-10 дней
Пиелонефрит (в т. ч. у беременных), течение в условиях стационара	<b>ЦЕФАБОЛ</b> - 1-2 г в/в или в/м каждые 8 часов	14 дней
Неосложненная гонорея	<b>ЦЕФАБОЛ</b> - 0,5 г в/м однократно	

<b>Диссеминированная гонококковая инфекция у взрослых</b>	<b>ЦЕФАБОЛ</b> – 0,5 г в/в или в/м каждые 12 часов (парентеральное введение продолжат 24-48 часов после клинического улучшения)	Индивидуально, рекомендуется ступенчатая терапия
<b>Инфекционный артрит</b>	<b>Взрослые: ЦЕФАБОЛ</b> - 1 г в/в или в/м каждые 8 часов +/- оксациллин 2 г в/в или в/м каждые 4-6 часов <b>Новорожденные:</b> <b>ЦЕФАБОЛ</b> - 50 мг/кг в/в каждые 6 часов + оксациллин 50-100 мг/кг/сут каждые 6 часов <b>Дети старше 1 месяца:</b> <b>ЦЕФАБОЛ</b> - 30-40 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов+оксациллин 25 мг/кг в/в или в/м каждые 6 часов	Гонококковый – 7 дней Негонококковый- 14-28 дней
<b>Профилактика инфекций перед хирургическими вмешательствами</b>	<b>ЦЕФАБОЛ</b> - вводят 1 г в/в или в/м (30-90 мин до начала операции)	
<b>При выполнении кесарева сечения</b>	<b>ЦЕФАБОЛ</b> – в момент наложения зажимов на пупочную вену в/в вводят 1 г препарата, затем через 6 и 12 ч повторно 1 г в/в или в/м	

*ЦЕФАБОЛ® может применяться с осторожностью у пациентов с непереносимостью пенициллинов.*