ЦЕФАМАБОЛ® (МНН Цефамандол)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Цефамабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Внебольничная пневмония, лечение в условиях общесоматического стационара	***Взрослые:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 0,5-1 в/в или в/м г каждые 6 часов ***Дети*:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 20-30 мг/кг в/в или в/м каждые 6 часов	7-10 дней
Неосложненные инфекции МВП (в т. ч. пиелонефрит)	***Взрослые***: **ЦЕФАМАБОЛ** - 0,5 г в/в или в/м каждые 8 часов ***Дети*:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 20 мг/кг в/в или в/м каждые 6- 8 часов	10-14 дней
Осложненные инфекции МВП	***Взрослые:*** **ЦЕФАМАБОЛ**-1 г в/в или в/м каждые 8 часов ***Дети*:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 25-30 мг/кг в/в или в/м каждые 6-8 часов	Не менее 14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей	***Взрослые:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 0,5 г в/в или в/м каждые 6 часов ***Дети*:*** **ЦЕФАМАБОЛ** - 20 мг/кг в/в или в/м каждые 6 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 7-14 дней
Периоперационная антибиотикопрофилактика	***Взрослые:*****ЦЕФАМАБОЛ**- внутривенно в дозе 1 г или 2 г вместе с премедикацией или вводным наркозом, но не ранее, чем за 1 час до начала операции; затем (при необходимости) в/в или в/м по 1 г или 2 г каждые 6 ч в течение 24-48 ч после операции. ***Дети старше3 мес*:*** **ЦЕФАМАБОЛ** вводят в том же режиме, что и взрослым, из расчета 50-100 мг/кг в сутки с интервалами между введениями 6 часов.-	

**Только детям старше 1 месяца*