

ЦЕФОПЕРАБОЛ (МНН Цефоперазон)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Цефоперабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Нозокомиальная пневмония	<i>Взрослые:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 1-2 г в/в или в/м каждые 8-12 часов +/- амикацин 15-20мг/кг/сутки в/в или в/м в 1-2 введения <i>Дети:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 80 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2 введения +/- амикацин 15-20 мг/кг/сутки в/в или в/м в 1-2 введения	7-10 дней
Холангит, холецистит	ЦЕФОПЕРАБОЛ - 1-2 г в/в или в/м каждые 12 часов	3-5 дней
Вторичный перитонит	<i>Взрослые:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 2 г в/в или в/м каждые 8-12 часов +метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Дети:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ: 80 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2 введения +метронидазол 22,5 мг/кг/сутки в 3 введения	7-10 дней
Пиелонефрит, лечение в условиях стационара	<i>Взрослые:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ – 1-2 г в/в или в/м каждые 12 часов <i>Дети:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 80 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2 введения	14 дней
ВЗОМТ	ЦЕФОПЕРАБОЛ - 2 г в/в или в/м каждые 12 часов	10-14 дней
Послеродовой эндометрит, септический аборт	ЦЕФОПЕРАБОЛ - 2 г в/в или в/м каждые 12 часов	7-10 дней
Сепсис, предположительно грамотрицательной этиологии	<i>Взрослые:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 2-4 г в/в каждые 8-12 часов <i>Дети:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ - 100-200 мг/кг/сутки в/в , в 2-3 введения	10-14 дней
Профилактика послеоперационных осложнений	<i>Взрослые:</i> ЦЕФОПЕРАБОЛ – 1-2 г в/в за 30-60 мин до начала операций, с последующим повторным введением каждые 12 ч.	В большинстве случаев в течение не более 24 часов.