

ЦЕФТРИАБОЛ® (МНН Цефтриаксон)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Цефтриабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит, включая менингит и энцефалит при клещевом боррелиозе (дети от 1 мес. и взрослые)	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ - 2 г в/в каждые 12 часов Дети*: ЦЕФТРИАБОЛ – начальная доза составляет 100 мг/кг массы тела один раз в сутки (максимально 4 г/сут), либо суточную дозу делят на два в/в введения, каждые 12 часов.	Зависит от возбудителя; в среднем 10-14 дней
Внебольничная пневмония, лечение в условиях стационара	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ - 1-2 г в/в или в/м каждые 24 часа Дети*: ЦЕФТРИАБОЛ - 50 мг/кг в/в или в/м каждые 24 часа (макс.доза 2 г/сутки)	7-10 дней
Подострый инфекционный эндокардит	ЦЕФТРИАБОЛ - 2 г в/в или в/м каждые 24 часа	4 недели
Вторичный перитонит	ЦЕФТРИАБОЛ - 2 г в/в или в/м каждые 12 часа + метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов	7-10 дней
Пиелонефрит (в т. ч. у беременных)	ЦЕФТРИАБОЛ – 1-2 г в/в или в/м каждые 24 часа	14 дней
Инфекционный артрит	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ – 1-2 г в/в или в/м каждые 12 часов, +/- оксациллин в/в по 2 г, 4-6 раза в сутки Дети: ЦЕФТРИАБОЛ - 50 мг/кг в/в или в/м каждые 24 часа +оксациллин 30-40мг/кг в/в или в/м каждые 6 часов	Гонококковый – 7 дней Негонококковый 14-28 дней
Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) (артрит, кардит, поражение лицевого нерва)	Взрослые и дети: ЦЕФТРИАБОЛ – 50 мг/кг/сут в/в 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 2 г)	14 дней
Острый средний отит у детей	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ - 1 г 1 р/сутки в/м Дети: ЦЕФТРИАБОЛ 50 мг/кг в/м 1 р/сутки	1-3 дня
Гонорея	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ - 0,25 г в/м однократно	1 день
Сифилис (первичный и вторичный, или летальный < 1 года)	ЦЕФТРИАБОЛ - 0,5-1 г в/м или в/в каждые 24 часа	8-10 дней
Острая диарея, вызванная <i>Salmonella spp.</i> (включая <i>S.typhi S.paratyphi</i>) <i>E.coli Y.enterocolitica</i>	Взрослые: ЦЕФТРИАБОЛ - 1-2 г в/в каждые 24 часа Дети*: ЦЕФТРИАБОЛ - 50 мг/кг массы тела в сутки в/в каждые 24 часа	Зависит от возбудителя; в среднем 5 дней

**Профилактика
послеоперационных
инфекций**

Взрослые и дети: ЦЕФТРИАБОЛ

1 г препарата вводят в/в однократно за 30-60 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке рекомендовано одновременное (нераздельное!) введение 2,0 г цефтриаксона и препарата из группы 5-нитромидазолов.