ЦЕФУРАБОЛ® (МНН Цефуроксим)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата \mathbf{Le} фурабол $^{\mathbb{B}}$

Цефурабол		
Нозология	Режим	Продолжительность
		терапии
-	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75 г	Зависит от
тканей (включая	в/в или в/м каждые 8 часов	возбудителя; в
послеоперационные	Дети*: ЦЕФУРАБОЛ - 20 мг/кг	среднем 7-14 дней
раневые инфекции и	в/в или в/м каждые 8 часов	
целлюлит на лице у		
детей)		
Бактериальный менингит	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 3 г в/в каждые 8 часов Дети*: ЦЕФУРАБОЛ — 150-250 мг/кг/сут, каждые 3-4 ч	
Внебольничная	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75-	7 10 moğ
	1,5 г в/в, каждые 8-12 часов, в	7-10 днеи
пневмония, лечение в	течение 48-72 ч, затем переходят на	
условиях общесоматического	прием внутрь, по 500 мг 2 раза в	
стационара	прием внугрь, по 300 мг 2 раза в сутки в течение 7-10 дней.	
Стационара	Дети*: ЦЕФУРАБОЛ - 20 мг/кг	
	в/в или в/м каждые 8 часов	
Hwanaakaassaasaa ay waxa		2.5
Интраабдоминальные инфекции	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75-1,5 г в/в или в/м каждые 8 часов +/-	3-5 дней
•	метронидазол 0,5 г каждые 8 часов	7.10
Вторичный перитонит	Дети*: ЦЕФУРАБОЛ - 25-30	7-10 дней
(кроме	мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов	
послеоперационного)		
	+/- метронидазол 7,5 мг/кг в/в	
т 1	каждые 8 часов	14×
Пиелонефрит	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75-	14 днеи
	1,5 г в/в или в/м каждые 8 часов	
	Дети*: ЦЕФУРАБОЛ - 25-30 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов	
Гатамая		
Гонорея	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75-	
	1,5 г в/м, однократно (или в виде 2	
	инъекции по 750 мг с введением в	
	разные области, например в обе	
Поотоположения	ягодичные мышчы)	7 10 mg
Послеродовой эндометрит,	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 0,75-	7-10 днеи
септический аборт	1,5 г в/в или в/м каждые 8 часов + метрочиналог 500 мг в/в или рег ос	
	метронидазол 500 мг в/в или per os каждые 8 часов +/- доксициклин	
	100 мг в/в или рег оз каждые 12	
	-	
Попускопольного	Pancenter HEDVDAFOH 15 P	
Периоперационная	Взрослые: ЦЕФУРАБОЛ - 1,5 г	
антибиотикопрофилактика	в/в препарата вместе с	
	премедикацией или вводным	
	наркозом, но не ранее, чем за 1 час	
	до начала операции. Только	
	пациентам с высоким риском	
	дополнительно назначают 0,75 г	

препарата через 8 и 16 часов после операции.

^{*-}дозы для новорожденных и детей до 3 мес., см в описании препарата.