

ГРИМИПЕНЕМ® (МНН Имипенем+Циластатин)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Гримипенем®

Нозология	Режим (расчет доз по имипенему)	Продолжительность терапии
<p>Инфекции нижних дыхательных путей (внебольничная и госпитальная пневмония, гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры)</p>	<p><i>Средней тяжести.</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*(старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 15 мг/кг в/в каждые 6 часов <i>Тяжелые.</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6 часов <i>Дети*(старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	<p>Внебольничная: 10-14 дней Госпитальная: 14-21 день</p>
<p>Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (абсцесс легких, эмпиема плевры)</p>	<p>Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6- 8 часов или 1 г 3 р/сутки <i>Дети (старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	<p>14-21 день</p>
<p>Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)</p>	<p><i>Средней тяжести</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*(старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 15 мг/кг в/в каждые 6 часов <i>Тяжелые</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6 часов <i>Дети*(старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	<p>7-10 дней</p>
<p>Гинекологический инфекции (ВЗОМТ, пельвиоперитонит, эндометрит) Послеродовые инфекционные осложнения</p>	<p><i>Средней тяжести</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Тяжелые</i> Взрослые: ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6 часов</p>	<p>10-14 дней, возможна ступенчатая терапия</p>
<p>Инфекции МВП</p>	<p>Взрослые неосложненные: ГРИМИПЕНЕМ - 0,25 г в/в каждые 6 часов Осложненные и средней тяжести:</p>	<p>Неосложненные: 7 дней Тяжелые и неосложненные 10-14 дней</p>

	<p>ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6-8 часов</p> <p><i>Дети*(старше 3 мес неосложненные):</i></p> <p>ГРИМИПЕНЕМ - 15 мг/кг в/в каждые 6 часов</p> <p><i>Осложненные и средней тяжести:</i></p> <p>ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	
Инфекции кожи и мягких тканей (раневая инфекция, абсцессы, флегмоны, некротизирующие инфекции)	<p><i>Взрослые:</i> ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6- 8 часов</p> <p><i>Дети* (старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 15-25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	7-10 дней
Сепсис	<p><i>Взрослые:</i> ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6- часов или 1,0 г в/в каждые 8 часов</p> <p><i>Дети* (старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов</p>	14-21 день
Остеомиелит (первичный (гематогенный) и вторичный (в т. ч. у больных с нарушением периферического кровообращения))	<p><i>Взрослые:</i> ГРИМИПЕНЕМ - 0,5 г в/в каждые 6 часов, <i>тяжелое течение</i> 1 г 3 р/сутки</p> <p><i>Дети* (старше 3 мес):</i> ГРИМИПЕНЕМ - 25 мг/кг в/в каждые 6 часов (но не более 2 г/сутки)</p>	Длительная Возможен переход на прием пероральных антибиотиков
Периоперационная антибиотикопрофилактика	<p><i>Взрослые:</i> ГРИМИПЕНЕМ - 1 г Гримипенема® во время вводного наркоза. В случае хирургического вмешательства с высокой степенью риска развития инфекции (операция на толстой и прямой кишке) дополнительно вводят по 500 мг через 8 и 16 ч после окончания операции.</p>	

**Дозы ГРИМИПЕНЕМА у детей младше 3 мес . см в описательной части*