

МАКСИЦЕФ® (МНН Цефепим)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Максицеф®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (дети от 2 мес. и взрослые)	<i>Взрослые:</i> МАКСИЦЕФ - 2 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 8 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 10-14 дней
Нозокомиальная пневмония и ВАП	<i>Взрослые:</i> МАКСИЦЕФ - 2 г в/в каждые 12 часов <i>Дети*:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 12 часов	14-21 день
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)	<i>Взрослые:</i> МАКСИЦЕФ - 2 г в/в или в/м каждые 8 часов +/- метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 12 часов +/- метронидазол 7,5 мг/кг в/в каждые 8 часов	7-10 дней
Инфекции мочевыводящих путей	<i>Взрослые:</i> <i>Неосложненные:</i> МАКСИЦЕФ - 0,5 - 1 г в/в или в/м каждые 12 часов <i>Тяжелые и осложнённые – МАКСИЦЕФ</i> - 1 - 2 г в/в каждые 12 часов <i>Очень тяжелые и угрожающие жизни –</i> 2 г в/в каждые 8 ч <i>Дети*:</i> <i>Неосложненные:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг 2 раза в сутки <i>Тяжелые и осложнённые – МАКСИЦЕФ-50 мг/кг 3 раза в сутки</i>	Неосложненные- 7-10 дней Тяжелые и осложненные-может потребоваться более длительный курс лечения
Послеродовой эндометрит, септический аборт	МАКСИЦЕФ - 1-2 г в/в или в/м каждые 12 часов + метронидазол 500 мг каждые 8 часов в/в или per os	7-10 дней
Сепсис	<i>Взрослые:</i> МАКСИЦЕФ - 2 г в/в каждые 12 часов +/- метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 12 часов +/- метронидазол 7,5 мг/кг в/в каждые 8 часов	14-21 день
Фебрильная нейтропения	<i>Взрослые:</i> МАКСИЦЕФ - 2 г в/в каждые 8 часов <i>Дети*:</i> МАКСИЦЕФ - 50 мг/кг 3 раза в сутки (макс. Разовая доза не должна превышать 2 г)	7 дней или до разрешения нейтропии
Профилактика инфекций при хирургических операциях	МАКСИЦЕФ – 2 г в/в вводят в виде инфузии в течении 30 мин за 60 мин до начала хирургической операции	

*-дозы для детей старше 2 месяцев