

## МЕРОПЕНАБОЛ® (МНН Меропенем)

### Рекомендуемые режимы терапии с использованием **МЕРОПЕНАБОЛА®**

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (в т. ч. послеоперационный или посттравматический)	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 2 г в/в каждые 8 часов <b>Дети от 3 мес. до 12 лет: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 40 мг/кг в/в каждые 8 часов При послеоперационном или посттравматическом менингитах к базовой терапии добавить: <b>Взрослым</b> - ванкомицин 500-750 мг в/в каждые 6 ч <b>Детям</b> - ванкомицин 15 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от этиологии: в среднем 14-21 день
Пневмония	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 500 мг в/в каждые 8 часов	
Нозокомиальная пневмония, включая ВАП	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 1 г в/в каждые 8 часов <b>Дети: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 20 мг/кг в/в каждые 8 часов	14-21 день
Тяжелый и/или осложненный пиелонефрит	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 0,5 г в/в каждые 8 часов <b>Дети: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 10 мг/кг в/в каждые 8 часов	14 дней
Синусит, средний отит на фоне ИВЛ	<b>МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 0,5 г в/в каждые 8 часов	5-7 дней
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный) Инфекционные осложнения панкреонекроза	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 1 г в/в каждые 8 часов или 0,5 г в/в каждые 6 часов <b>Дети: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 20 мг/кг в/в каждые 8 часов	7-10 дней
Тяжелая инфекция кожи и мягких тканей, в т. ч. послеоперационная раневая инфекция	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 0,5 г в/в каждые 8 часов <b>Дети: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 10-20 мг/кг в/в каждые 8 часов	10-14 дней
Сепсис	<i>Антибактериальная терапия должна быть начата незамедлительно после постановки диагноза</i> <b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 1 г в/в каждые 8 часов <b>Дети: МЕРОПЕНАБОЛ</b> – 20 мг/кг в/в каждые 8 часов	Индивидуально, в среднем 10-14 дней
Фебрильная нейтропения	<b>Взрослые: МЕРОПЕНАБОЛ</b> - 1 г в/в каждые 8 часов	Индивидуально, в среднем 7-10 дней

*Дети:* **МЕРОПЕНАБОЛ** –  
20 мг/кг в/в каждые 8 часов