

## МЕТРОНИДАЛ® (МНН Метронидазол)

### Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Метронидал®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
<b>Инфекции ЦНС (в т. ч. бактериальный абсцесс головного мозга)</b>	<b>Взрослые: МЕТРОНИДАЛ</b> - 0,5 г в/в каждые 6 часов или 1 г в/в, каждые 12 часов + цефалоспорины III-IV поколений <b>Дети: МЕТРОНИДАЛ</b> - 7,5 мг/кг в/в, каждые 6 часов + цефалоспорины III-IV поколений	Зависит от этиологии: в среднем 14-21 день
<b>Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (абсцесс легких, эмпиема плевры)</b>	<b>Взрослые: МЕТРОНИДАЛ</b> - 0,5 г в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений <b>Дети: МЕТРОНИДАЛ</b> - 7,5 мг/кг в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений	14-21 день
<b>Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)</b>	<b>Взрослые: МЕТРОНИДАЛ</b> - 0,5 г в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины III-IV поколений. <b>Дети: МЕТРОНИДАЛ</b> - 7,5 мг/кг в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины III-IV .	7-10 дней
<b>Гинекологические инфекции (ВЗОМТ, пельвиоперитонит, эндометрит) Послеродовые инфекции осложнения</b>	<b>Взрослые: МЕТРОНИДАЛ</b> - 0,5 г в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений, +/- <b>ВИДОКЦИН</b> 100 мг/ в/в каждые 12 часов	10-14 дней, возможна ступенчатая терапия
<b>Инфекции кожи и мягких тканей (раневая инфекция, абсцессы, флегмоны, наркотизирующие инфекции)</b>	<b>Взрослые: МЕТРОНИДАЛ</b> - 0,5 г в/в, каждые 8 часов + цефалоспорины II-IV поколений <b>Дети: МЕТРОНИДАЛ</b> – 7,5 мг/кг 3 раза в сутки	7-14 дней
<b>Профилактика послеоперационных анаэробных осложнений</b>	<b>Взрослые и дети старше 12 лет: МЕТРОНИДАЛ</b> 15 мг\кг (приблизительно 1 г больному с массой тела 70 кг) за 1 час до начала операции (длит.инфузии 30-60 минут), затем повторяют внутривенное капельное введение метронидазола в дозе 7,5 мг/кг через каждые 6	

	<p>часов после первого введения препарата.</p> <p>Через 1-2 дня после операции-переход на прием метронидазола внутрь в разовой дозе 7,5 мг/кг, каждые 6-8 часов в течение 7 дней.</p>	
<p><b>В качестве радиосенсибилизирующего средства</b></p>	<p>Взрослым: <b>МЕТРОНИДАЛ</b> 160 мг/кг массы тела или 4-6 г/м<sup>2</sup> поверхности тела за 0,5-1 ч до начала облучения. Максимальная разовая доза не должна превышать 10 г, курсовая – 60 г.</p>	<p>Применяют перед каждым сеансом облучения в течение 1-2 недель. В оставшийся период лучевого лечения метронидазол не применяют.</p>
<p><b>Гастрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori</b></p>	<p><b>Взрослым:</b> по 500 мг 3 раза в сутки в составе комбинированной терапии</p>	<p>В зависимости от комбинированной терапии</p>