

## НАЦЕФ® (МНН Цефазолин)

### Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата **Нацеф®**

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
<b>Инфекции кожи и мягких тканей</b>	<i>Взрослые:</i> <b>НАЦЕФ</b> -0,5-1 г в/в или в/м каждые 6-8 часов <i>Дети*:</i> <b>НАЦЕФ</b> -10-20 мг/ кг в/в или в/м каждые 8 часов	7-14 дней, возможна ступенчатая терапия
<b>Рожистое воспаление</b>	<i>Взрослые:</i> <b>НАЦЕФ</b> -0,5-1 г в/в или в/м каждые 6-8 часов <i>Дети*:</i> <b>НАЦЕФ</b> -10-20 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов	14 дней, возможна ступенчатая терапия
<b>Мастит лактационный</b>	<b>НАЦЕФ</b> -1 г в/в или в/м каждые 8 часов	7 дней
<b>Остеомиелит острый, обострение хронического</b> или	<i>Взрослые:</i> <b>НАЦЕФ</b> -1-2 г в/в или в/м каждые 8 часов <i>Дети*:</i> <b>НАЦЕФ</b> -40 мг/кг массы тела в сутки в/в или в/м каждые 8-12 часов	3 нед.
<b>Острый инфекционный эндокардит</b>	<b>НАЦЕФ</b> -2 г в/в каждые 8 часов + гентамицин 1 мг/кг каждые 8 часов (3-5 суток)	4-6нед.
<b>Стафилококковая язва роговицы</b>	<b>НАЦЕФ</b> -100 мг в виде субконъюнктивальной инъекции	5-7 дней
<b>Периоперационная антибиотикопрофилактика</b> (ортопедия, травматология, пластическая хирургия, плановая абдоминальная хирургия (кроме колоректальной))	<i>Взрослые:</i> <b>НАЦЕФ</b> -1 г в/в за 30 мин. до разреза (0,5-1 г – во время операции и по 0,5-1 г каждые 6-8 ч в течение суток после операции) <i>Дети*:</i> <b>НАЦЕФ</b> -10-20 мг/кг в/в за 30 мин. до разреза	

\*-только детям старше 1 месяца