

## ОФЛОКСАБОЛ® (МНН Офлоксабол)

### Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Офлоксабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Пневмония (в т. ч. вызванная стафилококками и грамотрицательными бактериями)	<i>Среднетяжелое течение:</i> <b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200 в/в каждые 12 часов <i>Тяжелое течение:</i> <b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 400 мг в/в каждые 12 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 7-14 дней
Вторичный перитонит (а т. ч. послеоперационный)	<b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200-400 мг в/в каждые 12 часов	7-10 дней
Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)	<i>Среднетяжелое течение:</i> <b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200 в/в каждые 12 часов <i>Тяжелое течение:</i> <b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 400 мг в/в каждые 12 часов	Тяжелые и осложненные- 10-14 дней
Инфекции органов малого таза у женщин	<b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200 мг в/в каждые 12 часов	10-14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей, в том числе раневая инфекция	<b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200-400 мг в/в каждые 12 часов	7-10 дней
Сепсис	<b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 400 мг в/в каждые 12	14-21 день
Послеоперационная антибиотикопрофилактика	<b>ОФЛОКСАБОЛ</b> - 200-400 мг в/в каждые 12 часов	