## ПЕФЛОКСАБОЛ® (МНН Пефлоксацин)

## Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием Пефлоксабола®

| Пефлоксаоола              |                             |                           |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Нозология                 | Режим                       | Продолжительность         |
|                           |                             | терапии                   |
| Бактериальный, менингит,  | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | Зависит от возбудителя; в |
| вызванный                 | в/в – первая доза, затем по | среднем 7-21 день         |
| менингококками или        | 400 мг в/в каждые 12 часов. |                           |
| грамотрицательными        |                             |                           |
| бактериями                |                             |                           |
| Инфекции нижних           | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | Зависит от возбудителя; в |
| дыхательных путей:        | в/в – первая доза, затем по | среднем 7-14 дней;        |
| пневмония (в т. ч.        | 400 мг в/в каждые 12 часов  | рекомендуется ступенчатая |
| вызванная                 | (при тяжелой инфекции: по   | терапия                   |
| грамотрицательными        | 400 мг в/в каждые 8 часов)  |                           |
| бактериями), обострение   |                             |                           |
| хронического бронхита,    |                             |                           |
| обострение                |                             |                           |
| бронхоэктатической        |                             |                           |
| болезни                   |                             |                           |
| Вторичный перитонит (в т. | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | 7-10 дней                 |
| ч. послеоперационный)     | в/в – первая доза, затем по |                           |
|                           | 400 мг в/в каждые 12 часов  |                           |
| Инфекции                  | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | 7-10дней                  |
| желчевыводящих путей      | в/в – первая доза, затем по |                           |
|                           | 400 мг в/в каждые 12 часов  |                           |
| Инфекции                  | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | Тяжелые и осложненные -   |
| мочевыводящих путей       | в/в – первая доза, затем по | 10-14 дней; рекомендуется |
| (ИМВП)                    | 400 мг в/в каждые 12 часов  | ступенчатая терапия       |
| Инфекции органом малого   | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | 10-14 дней                |
| таза у женщин             | в/в – первая доза, затем по |                           |
|                           | 400 мг в/в каждые 12 часов  |                           |
| Инфекции кожи и мягких    | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | 7-10 дней; рекомендуется  |
| тканей, в том числе       | в/в – первая доза, затем по | ступенчатая терапия       |
| раневая инфекция          | 400 мг в/в каждые 12 часов  | ·                         |
| Сепсис                    | ПЕФЛОКСАБОЛ - 800мг         | 14-21 день                |
|                           | в/в – первая доза, затем по |                           |
|                           | 400 мг в/в каждые 12 часов  |                           |
| Периоперационная          | ПЕФЛОКСАБОЛ - 400-          |                           |
| антибиотикопрофилактика   | 800мг в/в начать инфузию за |                           |
| population                | 60-90 мин. до операции.     |                           |
|                           | то то папа до операции.     |                           |