

## СУЛЬПЕРАЦЕФ® (МНН Цефоперазон/Сульбактам)

### Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Сульперацеф®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры (абсцессы, гангрена легких, эмпиема плевры)	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в или в/м каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в или в/м каждые 12 часов	14-21 день
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный) Третичный перитонит Инфекционный панкреонекроз	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в или в/м каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в или в/м каждые 12 часов	7-10 дней При инфекционном панкреонекрозе – до 3 нед.
Нозокомиальная пневмония и ВАП	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в каждые 12 часов	14-21 день
Гинекологические инфекции (эндометрит, пельвиоперитонит, амнионит)	<b>СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в или в/м каждые 12 часов	10-14 дней
Тяжелые инфекции кожи и мягких тканей, вызванные аэробно-анаэробной микрофлорой, инфекции у ожоговых больных	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в каждые 12 часов	10- 14 дней
Одонтогенные инфекции (абсцессы и флегмоны клетчаточных пространств на лице и шее)	<b>Взрослые : СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в каждые 12 часов	10-14 дней
Сепсис (в т. ч. нозокомиальный)	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в каждые 12 часов	14-21 день
Медиастинит (нисходящий одонтогенный, после перфорации пищевода или трахеобронхиальной перфорации, как осложнение ГДЗЛ)	<b>Взрослые: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 2 г в/в каждые 12 часов <b>Дети: СУЛЬПЕРАЦЕФ</b> - 40 мг/кг в/в каждые 12 часов	10-14 дней