

УРОФОСФАБОЛ® (МНН Фосфомицин)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Урофосфабол®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Инфекции ЦНС (бактериальный менингит, венитрикулит)	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 4,0 г в/в каждые 6 часов Дети: УРОФОСФАБОЛ - 300-400 мг/кг/сутки в/в в 4 введения	10-14 дней
Инфекции кожи и мягких тканей	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 2,0 г в/в или в/м каждые 6-8 часов Дети*: УРОФОСФАБОЛ - 100-200 мг/кг/сутки в/в в 3-4 введения	Зависит от тяжести; в среднем 7-10 дней
Остеомиелит**(острый и обострение хронического)	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 2,0-4,0 г в/в каждые 6-8 часов Дети: УРОФОСФАБОЛ - 200-300 мг/кг/сутки в/в в 3-4 введения	3-4 нед., возможна ступенчатая терапия
Бактериальный эндокардит	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 2,0 г в/в каждые 6-8 часов +/- гентамицин 1 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов Дети: УРОФОСФАБОЛ - 200- мг/кг/сутки в/в в 3- 4 введения +/- гентамицин 3 мг/кг/сутки в/в или в/м в 3 введения	4 недели 2недели 4недели 2недели
Внебольничная пневмония, тяжелое течение, лечение в стационаре	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 2,0 г в/в или в/м каждые 8 часов +/- ЦЕФАБОЛ -1,0-2,0 г в/в или в/м каждые 6-8 часов Дети*: УРОФОСФАБОЛ - 200- мг/кг/сутки в/в в 3- 4 введения +/- ЦЕФАБОЛ 50 мг/кг в/в или в/м каждые 8 часов	7-10 дней
Вторичный перитонит (в т. ч. послеоперационный)	Взрослые: УРОФОСФАБОЛ - 2,0 г в/в или в/м каждые 6-8 часов + метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов +/- амикацин 15 мг/кг/сутки в/в или в/м , в 1-2 введения Дети*: УРОФОСФАБОЛ 200 мг/кг/сутки в/в, в 3-4 введения + метронидазол 7,5 мг/кг в/в каждые 8 часов +/- амикацин 15 мг/кг/сутки в/в или в/м, в 1-2 введения	7-10 дней

Инфекции МВП (пиелонефрит, пиелит)	Взрослые: УРОФОСФОБОЛ - 1,0-2,0 г в/в или в/м каждые 6-8 часов Дети: УРОФОСФОБОЛ - 100-200 мг/кг/сутки в/в, в 3-4 введения	10-14 дней
Сепсис (в т. ч. у больных с нарушениями клеточного и гуморального иммунитета)	Взрослые: УРОФОСФОБОЛ -2,0-4,0 г в/в каждые 6-8 часов + СУЛЬПЕРАЦЕФ -2,0 г в/в каждые 12 часов или МАКСИЦЕФ -2 г в/в каждые 12 часов Дети: УРОФОСФОБОЛ - 200-300 мг/кг/сутки в/в, в 3-4 введения+ СУЛЬПЕРАЦЕФ -30-40 мг/кг в/в каждые 12 часов или (дети старше 2 мес.) МАКСИЦЕФ -50 мг/кг в/в каждые 12 часов	Зависит от этиологии, в среднем 10-21 день
Инфекции, вызванные полирезистентными грамположительными кокками (Enterococcus spp, Staphylococcus spp.)	Взрослые: УРОФОСФОБОЛ - 2,0-4,0 г в/в каждые 6-8 часов+ ванкомицин-1,0 г в/в каждые 12 часов Дети: УРОФОСФОБОЛ 200мг/кг/сутки в 3-4 в/в введения + ванкомицин-15 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от локализации и тяжести инфекции

**У детей старше 2,5 лет возможно в/м введение по 500-1000 мг каждые 8 ч (Правила приготовления см. в инструкции по применению)*