

ВАНКОМАБОЛ® (МНН Ванкомицин)

Рекомендуемые режимы терапии и профилактики с использованием препарата Ванкомабола®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ - 500-750 мг в/в каждые 6 часов Дети: ВАНКОМАБОЛ - 15 мг/кг в/в каждые 6 часов	Зависит от возбудителя; в среднем 7-14 дней
Пневмония, вызванная MRSA	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ - 500мг в/в каждые 6 часов или по 1 г в/в каждые 12 ч. Дети: ВАНКОМАБОЛ - 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	14-21 день
Бактериальный эндокардит	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ - 500 мг в/в каждые 6 часов или по 1 г в/в каждые 12 ч +/- гентамицин 3 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2-3 введения Дети: ВАНКОМАБОЛ - 10 мг/кг в/в каждые 6 часов +/- гентамицин 3 мг/кг/сутки в/в или в/м в 2-3 введения	4-6 недель (2 нед. Для гентамицина)
Инфекции мягких тканей, вызванные MR Staphylococcus spp.	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ - 15 мг/кг в/в 2 раза в сутки Дети: ВАНКОМАБОЛ - 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	10-14 дней
Сепсис, вызванный грамположительными аэробными кокками и грамположительными бактериями	Взрослые: ВАНКОМАБОЛ - 500 мг в/в каждые 6 часов или по 1 г в/в каждые 12 ч Дети: ВАНКОМАБОЛ - 10 мг/кг в/в каждые 6 часов	14-21 день