

ВИЦЕФ® (МНН Цефтазидим)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Вицеф®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Бактериальный менингит (в т. ч. послеоперационный или посттравматический)	<p>Взрослые: ВИЦЕФ - 2 г в/в каждые 8 часов +/- ванкомицин 500-750 мг в/в каждые 6 часов</p> <p>Дети в возрасте до 1 мес: ВИЦЕФ - 30 мг/кг в/в каждые 8 часов +/- ванкомицин - 15 мг/кг в/в в качестве первой нагрузочной дозы, затем 12 мг/кг в/в каждые 8 ч.</p> <p>Дети от 1 мес. до 12 лет: ВИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 8 часов (суточная доза 150 мг/кг, но не выше 6 г/сут, в 3 введения) +/- ванкомицин 15 мг/кг в/в каждые 6 ч.</p> <p>Комбинации с ванкомицином показаны при послеоперационном или посттравматическом менингитах.</p>	Зависит от этиологии; в среднем 14-21 день
Нозокомиальная пневмония	<p>Взрослые: ВИЦЕФ - 0.5-1 г в/в или в/м каждые 8 часов</p> <p>Дети от 1 мес. до 12 лет: ВИЦЕФ - 100-150 мг/кг/сутки в 3 введения</p>	21 день
Легочные инфекции у больных муковисцидозом	<p>Взрослые: ВИЦЕФ 30-50 мг/кг в/в каждые 8 часов</p> <p>Дети: ВИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 8 часов</p>	21 день
Тяжелый или осложненный пиелонефрит	<p>Взрослые: ВИЦЕФ - 0.5 г в/в или в/м каждые 8 часов</p> <p>Дети старше 1 мес. и до 12 лет: ВИЦЕФ - 50 мг/кг/сутки в 3 введения</p>	14 дней
Синусит, средний отит на фоне ИВЛ	<p>Взрослые: ВИЦЕФ - 0.5-1 г в/в или в/м каждые 8 часов</p>	7-10 дней
Вторичный перитонит (в т.ч. послеоперационный)	<p>Взрослые: ВИЦЕФ - 2г в/в или в/м каждые 8 часов + метронидазол 0,5 г в/в каждые 8 часов</p> <p>Дети: ВИЦЕФ - 100-150 мг/кг/сутки в 3 введения + метронидазол 7,5 мг/кг в/в каждые 8 часов</p>	7-10 дней

Инвазивная инфекция ожоговых ран, ожоговый сепсис (эмпирическая терапия)	Взрослые: ВИЦЕФ – 2 г в/в каждые 8 часов Дети: ВИЦЕФ - 100-150 мг/кг/сутки в 3 введения	10-14 дней
Фебрильная нейтропения	Взрослые: ВИЦЕФ – 2 г в/в каждые 8 часов Дети: ВИЦЕФ - 50 мг/кг в/в каждые 8 часов	Индивидуально, в среднем 7-10 дней