

ВИДОКЦИН® (МНН Доксициклин)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарата Видокцин®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Инфекции нижних дыхательных путей (в т. ч. вызванные <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i>)	Взрослые: ВИДОКЦИН 100 мг в/в, каждые 12 часов или 200 мг в/в каждые 24 часа Дети старше 8 лет: ВИДОКЦИН 4 мг/кг/сутки в 1-2 в/в введения	В среднем 5-7 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Инфекции органов малого таза у женщин (ВЗОМТ)	Взрослые: ВИДОКЦИН 100 мг в/в каждые 12 часов или 200 мг в/в каждые 24 часа +цефалоспорины II-IV поколений +/-метронидазол 500 мг каждые 12 часов в/в или per os	10-14 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Сифилис (первичный и вторичный)	Взрослые: ВИДОКЦИН 300 мг/сутки в/в в сутки	Не менее 10 дней; рекомендуется ступенчатая терапия
Сибирская язва (профилактика и лечение)	Взрослые: ВИДОКЦИН 100 мг в/в каждые 12 часов Дети старше 8 лет: ВИДОКЦИН >8 лет и > 45 кг- по 100 мг, > 8 лет и 45 кг- по 2,2 мг/ кг, 8 лет – по 2,2 мг/кг массы тела.	60 дней, рекомендуется ступенчатая терапия
Риккетсиозы и бактериальные зоонозы: -туляремия -бруцеллез -лептоспироз -чума	Взрослые: ВИДОКЦИН 200 мг в/в 1 раз в сутки в первый день терапии, затем по 100 мг в/в, каждые 12 часов. Дети старше 8 лет: ВИДОКЦИН 4 мг/кг/сутки в 1-2 в/в введения Для терапии бруцеллеза: ВИДОКЦИН 100 мг в/в 2 р/сутки комбинируют: у взрослых – стрептомицин 1 г/сутки в/м в течение первых 15 дней терапии, 1,5 месяца; или гентамицин 5 мг/кг массы тела в/м 1 раз в сутки или Рифампицин внутрь в дозе 600-900 мг/сутки в 1-2 приема 1,5 месяца	Туляремия-10-14 дней Бруцеллез-от 1,5 до 6 месяцев Лептоспироз-7-10 дней Чума-7-10 дней Рекомендуется ступенчатая терапия
Инфекции	Взрослые: ВИДОКЦИН	7-10 дней, рекомендуется

мочевыводящих путей (в т. ч. у больных с аллергией на пенициллины)

100 мг в/в каждые 12 часов
Дети старше 8 лет:
ВИДОКЦИН 4 мг/кг/сутки
в 1-2 в/в введения

ступенчатая терапия