

ВИЛИМИКСИН® (МНН Полимиксин В)

Рекомендуемые режимы терапии с использованием препарат Вилимиксин®

Нозология	Режим	Продолжительность терапии
Сепсис (предполагаемые или установленные возбудители – грам (-) аэробные бактерии)	Взрослые: ВИЛИМИКСИН - 1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч Дети: ВИЛИМИКСИН - 1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч	7-10 дней
Нозокомиальная пневмония, вызванная полирезистентным грам (-) возбудителями, особенно <i>P.aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter spp.</i> , <i>Klebsiella spp.</i>	Взрослые: ВИЛИМИКСИН - 1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч Дети: ВИЛИМИКСИН - 1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч	7-14 дней
Инфекции у обожженных	Взрослые: ВИЛИМИКСИН - 1-1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч или 2,5 мг/кг/сутки на 3 в/м введения Дети: ВИЛИМИКСИН - 1,2 мг/кг в/в каждые 12 ч или 2,5 мг/кг/сутки на 3 в/м введения	7-10 дней
Бактериальный менингит	Взрослые и дети до 2 лет: ВИЛИМИКСИН - интратекально по 5 мг 1 раз в сутки в течение 3-4 дней, затем по 5 мг через день Дети до 2 лет: ВИЛИМИКСИН - интратекально по 2 мг 1 раз в сутки в течение 3-4 дней, затем по 2 мг через день	14-18 дней
Кератит, конъюнктивит Язва роговицы, вызванная синегнойной палочкой	Местно: 0,1-0,25% раствор закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-3 капли; в первые сутки- с интервалом в 1 час Субконъюнктивально: 5-10 мг/сутки	5-7 дней
Селективная деконтаминация кишечника Инфекции кишечника	В виде одного раствора внутрь: Взрослые: ВИЛИМИКСИН - 100 мг каждые 6 ч Дети: ВИЛИМИКСИН - 40мг/кг/сутки в 3 приема Селективная деконтаминация кишечника: ВИЛИМИКСИН - 100	5-7 дней

	мг+гентамицин 80 мг+амфотерицин в500 мг; по 10 мл суспензии внутрь (через зонд) каждые 6 часов	
--	---	--